



YaraVitaTM

StopitTM

NOTICE

Before using this product, read the entire label

AVIS

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce qui figure sur l'ensemble de l'étiquette

StopitTM

HIGH ANALYSIS CALCIUM
A concentrated liquid calcium fertilizer for use on apples

CALCIUM CONCENTRE
Engrais au calcium sous forme liquide concentrée pour les pommes

Guaranteed minimum analysis/Analyse minimum garantie:
Calcium (Ca) 12%

Batch No: See top of pack

Numéro du lot: Voir la partie supérieure de l'emballage

See back of pack for further information

Voir au verso pour de plus amples renseignements

Yara Canada Inc.
1874 Scarth Street, Ste 1800, Regina, Canada S4P 4B3.
Tel: 1 888 968 8666

Made in the U.K./Fabriqué au R.U. Yara UK Ltd., Manor Place,
Wellington Road, The Industrial Estate, Pocklington, York YO42 1DN, U.K

Warning

calcium chloride
H319: Causes serious eye irritation.
P280: Wear eye protection.
P264: Wash hands thoroughly after handling.
P305+P351+P338+P337+P313: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.

Attention

chlorure de calcium
H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
P280: Porter un équipement de protection des yeux.
P264: Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P305+P351+P338+P337+P313: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

10 litres

**Net weight/
Poids net
13.27 kg**



Proud to be associated with:

CleanFARMS[®]

09.02.21

WLCA4051

YaraVita Stopit™

RECOMMENDED APPLICATION RATES AND TIMINGS

Apples: 5 to 10 l/ha at 10 to 14 day intervals so that the final application is made one week before harvest. Water rate: 500 l/ha.

Apricots, Cherry, Peaches, Plums: 10 l/ha applied 4 and 2 weeks before harvest. Water rate: 500 l/ha.

Brassicas: 2 to 3 applications of 5 l/ha from stem extension/head development to harvest. Allow 10 to 14 day intervals between application. Water rate: 200 l/ha.

Carrots: 2 to 3 applications of 5 l/ha at 10 to 15 cm crop height. Allow 10 to 14 day intervals between applications. Water rate: 200 l/ha.

Vines: 2 applications of 10 l/ha, 10 to 14 days apart, commencing at veraison. Water rate: 500 l/ha.

Cucurbits, Squash (Field Grown): 2 to 3 applications of 5 l/ha commencing at fruit set with 7 day intervals between applications. Water rate: 200 l/ha.

Onions: 5 l/ha at bulb swelling. Repeat applications at 10 to 14 day intervals as necessary. Water rate: 200 l/ha

Potatoes: 2 to 3 applications of 5 l/ha commencing at tuber initiation (when 50% of tip swellings are twice the diameter of the rest of the stolon) with 10 to 14 day intervals between applications. Also, apply during tuber bulking, following petiole analysis. Water rate: 200 l/ha.

Tomatoes (Field Grown): 1 to 4 applications of 5 l/ha from flowering on second truss onwards. Water rate: 500 l/ha.

YaraVita Stopit™

DOSES ET STADES D'APPLICATION

Pommiers: 5-10 l/ha tous les 10-14 jours. Commencer les applications pour que le dernier traitement soit effectué 1 semaine avant la cueillette (pour les pommiers 2-3 applications de 5-10 l/ha à partir de la chute des pétales et tous les 10-14 jours). Volume d'eau: 500 l/ha.

Abricotiers, Cerisier, Pêcher, Pruniers: 10 l/ha appliqués 4 et 2 semaines avant la cueillette. Volume d'eau: 500 l/ha.

Crucifères: 2-3 applications de 10 l/ha à partir de la montaison à 10-14 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

Carottes: 2-3 applications de 5 l/ha à partir du stade 10-15 cm et tous les 7-14 jours. Volume d'eau: 200 l/ha.

Vignes: 2 applications de 10 l/ha à 10-14 jours d'intervalle à partir de la véraison. Volume d'eau: 500 l/ha.

Concombres, Potiron (De Plein Champ): 3-5 applications de 5 l/ha tous les 7 jours à partir de la nouaison. Volume d'eau: 200 l/ha.

Oignons: 5 l/ha pendant le grossissement. Répéter à 10-14 jours d'intervalle. Volume d'eau: 200 l/ha.

Pommes De Terre: 2-3 applications tous les 10-14 jours de 5 l/ha à partir de l'initiation des tubercules (quand 50% des stolons se sont gonflés à 2 fois leur diamètre normal juste derrière la pointe). Appliquer aussi pendant le grossissement suite à l'analyse pétiolaire. Volume d'eau: 200 l/ha.

Tomates (De Plein Champ): 1-4 applications de 5 l/ha à partir de la floraison du deuxième bouquet. Répéter à 10-14 jours d'intervalle.

DIRECTIONS FOR USE

ALWAYS FOLLOW THESE LABEL INSTRUCTIONS

Mix the product thoroughly before use. Slowly add the product to the tank, via the induction hopper, whilst agitating. Top up with water and continue to agitate until spraying is completed.

TANK MIXING/CO-APPLICATION

Read ALL labels carefully and adhere strictly to the instructions for use. Co-application is entirely at the risk of the end-user. Before co-application of products you, or your advisor, must visit www.tankmix.com for important information. Alternatively, contact Yara for specific advice.

PRECAUTIONS

Only to be used on protected crops if specifically listed. Avoid application under extremes of climate, e.g. rapid drying conditions, extremely slow drying conditions, frost, rain, or when frost or rain are anticipated. Wear suitable gloves and face shield when handling this product. Clean all equipment before and after use.

STORAGE

Keep in a cool, dry chemical store, out of reach of children and livestock. Protect from frost and other climatic extremes (temperatures exceeding 40°C). Dispose of contents and container in accordance with all local, regional, national and international regulations.

CONDITIONS OF SALE

This Product is sold subject to the seller's Terms and Conditions of Sale, which are available upon request. Use of the Product is acceptance by the buyer of the Terms and Conditions of Sale.

MODE D'EMPLOI

SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS QUI FIGURENT SUR L'ETIQUETTE

Secouer le bidon et verser le produit à travers un filtre dans la cuve remplie aux trois-quarts d'eau. L'agitateur doit être en fonctionnement pendant cette opération. Finir de remplir la cuve et procéder à la pulvérisation. Maintenir l'agitation pendant toute la durée de la pulvérisation.

MÉLANGE EN CUVE/CO-APPLICATION DE PRODUITS :

Lire attentivement TOUTES les étiquettes des produits à mélanger et suivre scrupuleusement les instructions d'utilisation. Les risques liés au mélange et à la co-application de produits sont entièrement sous la responsabilité de l'utilisateur final. Avant tout mélange de produit, consultez ou demandez à votre conseiller de consulter les informations contenues sur notre site www.tankmix.com. Pour des conseils plus spécifiques, vous pouvez également contacter directement un représentant Yara.

PRÉCAUTIONS

N'utiliser ce produit sur des cultures protégées que si celles-ci sont spécifiquement listées sur l'étiquette. Évitez l'application dans des situations climatiques extrêmes, par exemple en conditions de séchage des feuilles soit très rapide soit extrêmement lent, en cas de gel, de pluie ou lorsque ces conditions sont anticipées.. Portez des gants appropriés ainsi qu'un écran facial lorsque vous utilisez ce produit. Nettoyez tous les équipements avant et après utilisation.

STOCKAGE

A conserver dans un local frais et sec, hors de portée des enfants ou des animaux. A protéger contre le gel et autres températures extrêmes (températures > 40 °C). Eliminer les bidons et leur contenu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au niveau local, régional, national et international.

CONDITIONS DE VENTE:

La vente de ce produit est soumise aux conditions générales de vente du vendeur. Tout acheteur reconnaît en avoir eu connaissance et celles-ci sont également disponibles sur demande auprès de votre contact commercial Yara. L'utilisation du produit par l'acheteur implique que celui-ci accepte ces conditions de vente.